

# 酸素で 作物イキイキ!!



酸 素 供 給

エム

オー

エックス<sup>®</sup>


M·O·X<sup>®</sup>

液剤10kg入

# 酸素供給剤

## 特徴

- 即効性の酸素をM·O·X10kgから約200ℓ放出します。
- 土の中で分解しますので、土の中を好気性にします。
- 土自体をやわらかくします。
- 根の呼吸を助け、根の張りを旺盛にします。



## 使用場面

- 成り疲れの症状が見られる作物
- 根が弱っている作物
- 肥料の吸収を良くしたい時（液肥を与える当日～3日前）
- 湿害を受けた圃場
- 硬く締まった圃場
- 堆肥・有機物等を入れた圃場
- 栽培期間が高温期や低温期にかかる作物

## 使用方法

### 果菜類 (キュウリ・イチゴ・トマト・ナス・メロン・ピーマン・スイカ)

育苗時: 100倍液を灌水時に施用する。  
定植時: 100倍液を苗をドブ漬け又は灌水する。  
定植後: 灌水: 100倍液以上に希釈して  
1000ℓ以上/10a  
葉面散布: 100倍液を200ℓ～  
400ℓ/10a

### 花卉類 (菊・カーネーション・シクラメン・ラン・トルコギキョウ)

※ベット栽培 定植時: 100倍液を散布  
又は灌水。  
定植後1～2週間毎に灌水。  
※鉢栽培 植替前後に100倍液を散布  
又は灌水。

### 水稻

種粉浸漬時: 50倍液で72時間浸漬  
育苗時: 100倍液を育苗箱に500cc灌水する。  
出穂時: 出穂20日前から2ℓ～3ℓ/10aを  
10日毎に4回流し込む。

### 葉菜類 (レタス・キャベツ・白菜・ホウレンソウ・小松菜・大葉・春菊)

育苗時: 100倍液を灌水時に施用する。  
定植時: 100倍液に苗をドブ漬けする。  
レタス、キャベツ、白菜: 結球初期から4～5日  
おきに3～4回100倍液を300ℓ/10a

### 根茎類 (大根・さつまいも・にんじん・たまねぎ・アスパラガス・セルリー・ネギ・ニラ)

葉面散布: 100倍液を200ℓ/10a  
灌水: 100倍以上に希釈し、株元灌水する。  
※ニラ: 収穫直後100倍液散布。

## 使用上の注意

M·O·Xとアルカリ性の強い薬剤あるいは、  
鉄剤との混用はさけて下さい。  
(葉面散布は夕方に行うのが効果的です。)

代理店

製造元



保土谷化学工業株式会社

東京都中央区八重洲二丁目4番1号 TEL: 03-5299-8140